

# SOINS PALLIATIFS

## &

### ARBRE DECISIONNEL POUR SOINS DE BOUCHE<sup>(3)</sup>

Soins pluriquotidiens pour protéger et maintenir l'intégrité de la cavité buccale après évaluation de l'état buccal avec grille, gants, lampe

#### Bouche saine

Lèvres : vaseline, stick baume, Lansoÿl

Hygiène buccale de base (brossage dents au dentifrice et /ou soin de bouche d'hygiène (eau)

Soins de bouche « plaisir »

Lèvres : Si O2 masque : gel KY, Bioxtra

#### Bouche sèche

#### Bouche sale

Rôle propre : soin de bouche d'hygiène + sur prescription : **protocole bicarbonate à 1,4%** (stabilité 24 à 48H au frigo)

En bain de bouche sans dilution et/ ou nettoyage de la cavité buccale et de la langue avec bâtonnets mousse 15 minutes après les repas

Si dépôts, croûtes : gel Bioxtra, Lansoÿl, Coca, ananas à renouveler pour ramollir puis 4x par jour + déterision à la brosse à dents souple ou pédiatrique

#### Bouche douloureuse

**PLAIE, APHTES, MUCITE,...**

**Protocole bicarbonate** puis **bain de bouche Morphine**

1amp de 10mg dans 10ml eau stérile (une heure avant les repas pour éviter les fausses routes)

**Aspégic 1g** dans 1verre d'eau

Préparation : 250 ml bicarbonate 1.4%+ **40 à 120 mg Solumédrol + ½ flacon lidocaïne à 1%** 3 fois/j

**Episil** : protecteur buccal si mucite post chimio

**Antalgiques voie générale**

#### Bouche inflammatoire

**Protocole bicarbonate** puis au choix

Bain de bouche Ulcarr suspension buvable 1g : un sachet dans un verre d'eau x4/jour (après les repas)

Herpès : **Zovirax** 1g per os par jour

**Antalgiques par voie générale**

#### Bouche hémorragique

**Protocole bicarbonate** puis **Exacyl** en hémostatique local

ou **Exacyl** 1 ampoule buvable dans un verre d'eau 2 à 4 fois / jour

Sucer des glaçons  
 Eviter les aliments et boissons chaudes

**+ - Antalgiques par voie générale**

#### Bouche mycosique

**Protocole bicarbonate** puis au choix

Gargarisme Fungizone ou **Triflucan** solution buvable puis avaler

**Loramyc 50mg**  
 1 comprimé gingival mucoadhésif par jour pendant 7 à 14 jours

**+ - Antalgiques par voie générale**

#### Bouche malodorante

**Protocole bicarbonate** puis Applications locales

**Flagyl** suspension buvable 4% à appliquer pure ou en badigeon 4 à 6 fois / jour +ou - **Flagyl per os ou IV**

**+ - Antalgiques par voie générale**