

SOINS PALLIATIFS

& Sédation : feuille de surveillance

ETIQUETTE
PATIENT

Date d'induction : Dose d'induction : Sédation proportionnée Sédation Profonde et continue

Procédure collégiale le Voie IV Voie SC Antalgique prescrit Matelas à air Poids estimé :

Jours	1 ^{ère} heure				J1			J2		
	15 min	30 min	45 min	60 min	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit
Moment de la journée										
Etat de la voie d'abord										
Dose horaire Midazolam	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire autre sédatif	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire antalgique	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
RASS										
ALGOPLUS	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5
Soins de bouche										

RASS : score de Richmond sédation proportionnée : Objectif RASS -1 à -3 Sédation profonde et continue : Objectif RASS -4 à -5

Jours	J3			J4			J5		
	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit
Moment de la journée									
Etat de la voie d'abord									
Dose horaire Midazolam	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire autre sédatif	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire antalgique	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
RASS									
ALGOPLUS	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5
Soins de bouche									

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)		
Pointage	Niveau	Comportement observable
+4	Combatif	Combatif, danger immédiat envers l'équipe.
+3	Très agité	Tire, arrache tuyaux et cathéters et/ou agressif envers l'équipe
+2	Agité	Mouvements fréquents sans but précis et/ou désadaptation au respirateur
+1	Nerveux	Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, non agressifs
0	Réveillé et calme	
-1	Somnolent	Pas complètement éveillé, mais reste éveillé avec contact visuel à l'appel (> 10 sec)
-2	Sédation légère	Reste éveillé brièvement avec contact visuel à l'appel (< 10sec)
-3	Sédation modérée	N'importe quel mouvement à l'appel (ex : ouverture des yeux) mais pas de contact visuel
-4	Sédation profonde	Aucun mouvement à l'appel, n'importe quel mouvement à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)
-5	Non stimuable	Aucun mouvement, ni à l'appel, ni à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)

Surveillance de la douleur : ALGOPLUS		
Visage	Froncement des sourcils, grimaces, crispation,	OUI (1)/ NON (0)
Regard	Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés	OUI (1)/ NON (0)
Plaintes	« Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris	OUI (1)/ NON (0)
Corps	Retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées	OUI (1)/ NON (0)
Comportement	Agitation ou agressivité, agrippement	OUI (1)/ NON (0)
Score total	Si score > ou égal à 2 : Patient douloureux	/5
Soins de bouche		
Bouche douloureuse	Xylocaïne® gel 1 càc à la demande Ou 1g Aspégic® dans un verre d'eau en bain de bouche Ou Solumédrol® 40 à 120mg dans 500ml de bicarbonate 14‰ + 1 flacon de xylocaïne 2%, en bain de bouche, à renouveler aussi souvent que nécessaire	
Bouche mycosique	Bains de bouche au bicarbonate fréquents et antimycotiques	
Bouche sale Croustes ou dépôt	Soins de bouche avec Lansoyl® dilué, laisser agir une heure puis soins au bicarbonate Ou utiliser Coca- cola® (ananas si non ulcérée)	
Bouche ulcérée ou aphtes	Selon étiologie : Infection microbienne : Flagyl® 0,5 à 1,5g/j Herpès : Zovirax® ou Zelitrex® 1g/j Ulcère Ulcar® suspension : 1 sachet dilué dans un peu d'eau stérile, en bain de bouche	
Bouche sèche	Soins de bouche au Bicarbonate, Gel Bioextra®	
Bouche malodorante	Identifier la cause, Flagyl® par voie locale ou générale	

Jours	J6			J7			J8		
Moment de la journée	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit
Etat de la voie d'abord									
Dose horaire Midazolam	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire autre sédatif	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire antalgique	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
RASS									
ALGOPLUS	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5
Soins de bouche									

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)		
Pointage	Niveau	Comportement observable
+4	Combatif	Combatif, danger immédiat envers l'équipe.
+3	Très agité	Tire, arrache tuyaux et cathéters et/ou agressif envers l'équipe
+2	Agité	Mouvements fréquents sans but précis et/ou désadaptation au respirateur
+1	Nerveux	Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, non agressifs
0	Réveillé et calme	
-1	Somnolent	Pas complètement éveillé, mais reste éveillé avec contact visuel à l'appel (> 10 sec)
-2	Sédation légère	Reste éveillé brièvement avec contact visuel à l'appel (< 10sec)
-3	Sédation modérée	N'importe quel mouvement à l'appel (ex : ouverture des yeux) mais pas de contact visuel
-4	Sédation profonde	Aucun mouvement à l'appel, n'importe quel mouvement à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)
-5	Non stimuable	Aucun mouvement, ni à l'appel, ni à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)

Surveillance de la douleur : ALGOPLUS		
Visage	Froncement des sourcils, grimaces, crispation,	OUI (1)/ NON (0)
Regard	Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés	OUI (1)/ NON (0)
Plaintes	« Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris	OUI (1)/ NON (0)
Corps	Retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées	OUI (1)/ NON (0)
Comportement	Agitation ou agressivité, agrippement	OUI (1)/ NON (0)
Score total	Si score > ou égal à 2 : Patient douloureux	/5

Soins de bouche	
Bouche douloureuse	Xylocaïne® gel 1 càc à la demande Ou 1g Aspégic® dans un verre d'eau en bain de bouche Ou Solumédrol® 40 à 120mg dans 500ml de bicarbonate 14‰ + 1 flacon de xylocaïne 2%, en bain de bouche, à renouveler aussi souvent que nécessaire
Bouche mycosique	Bains de bouche au bicarbonate fréquents et antimycotiques
Bouche sale Croutes ou dépôt	Soins de bouche avec Lansoyl® dilué, laisser agir une heure puis soins au bicarbonate Ou utiliser Coca- cola® (ananas si non ulcérée)
Bouche ulcérée ou aphtes	Selon étiologie : Infection microbienne : Flagyl® 0,5 à 1,5g/j Herpès : Zovirax® ou Zelitrex® 1g/j Ulcère Ulcar® suspension : 1 sachet dilué dans un peu d'eau stérile, en bain de bouche
Bouche sèche	Soins de bouche au Bicarbonate, Gel Bioextra®
Bouche malodorante	Identifier la cause, Flagyl® par voie locale ou générale

Jours	J9			J10			J11		
	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit	Matin	Après-midi	Nuit
Moment de la journée									
Etat de la voie d'abord									
Dose horaire Midazolam	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire autre sédatif	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
Dose horaire antalgique	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h	mg/h
RASS									
ALGOPLUS	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5	/5
Soins de bouche									

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)		
Pointage	Niveau	Comportement observable
+4	Combatif	Combatif, danger immédiat envers l'équipe.
+3	Très agité	Tire, arrache tuyaux et cathéters et/ou agressif envers l'équipe
+2	Agité	Mouvements fréquents sans but précis et/ou désadaptation au respirateur
+1	Nerveux	Anxieux ou craintif, mais mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, non agressifs
0	Réveillé et calme	
-1	Somnolent	Pas complètement éveillé, mais reste éveillé avec contact visuel à l'appel (> 10 sec)
-2	Sédation légère	Reste éveillé brièvement avec contact visuel à l'appel (< 10sec)
-3	Sédation modérée	N'importe quel mouvement à l'appel (ex : ouverture des yeux) mais pas de contact visuel
-4	Sédation profonde	Aucun mouvement à l'appel, n'importe quel mouvement à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)
-5	Non stimuable	Aucun mouvement, ni à l'appel, ni à la stimulation physique (friction non nociceptive de l'épaule ou du sternum)

Surveillance de la douleur : ALGOPLUS		
Visage	Froncement des sourcils, grimaces, crispation,	OUI (1)/ NON (0)
Regard	Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés	OUI (1)/ NON (0)
Plaintes	« Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris	OUI (1)/ NON (0)
Corps	Retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées	OUI (1)/ NON (0)
Comportement	Agitation ou agressivité, agrippement	OUI (1)/ NON (0)
Score total	Si score > ou égal à 2 : Patient douloureux	/5
Soins de bouche		
Bouche douloureuse	Xylocaïne® gel 1 càc à la demande Ou 1g Aspégic® dans un verre d'eau en bain de bouche Ou Solumédrol® 40 à 120mg dans 500ml de bicarbonate 14‰ + 1 flacon de xylocaïne 2%, en bain de bouche, à renouveler aussi souvent que nécessaire	
Bouche mycosique	Bains de bouche au bicarbonate fréquents et antimycotiques	
Bouche sale Crottes ou dépôt	Soins de bouche avec Lansoyl® dilué, laisser agir une heure puis soins au bicarbonate Ou utiliser Coca-cola® (ananas si non ulcérée)	
Bouche ulcérée ou aphtes	Selon étiologie : Infection microbienne : Flagyl® 0,5 à 1,5g/j Herpès : Zovirax® ou Zelitrex® 1g/j Ulcère Ulcar® suspension : 1 sachet dilué dans un peu d'eau stérile, en bain de bouche	
Bouche sèche	Soins de bouche au Bicarbonate, Gel Bioextra®	
Bouche malodorante	Identifier la cause, Flagyl® par voie locale ou générale	