

SOINS PALLIATIFS

& VOIE SOUS-CUTANEE⁽²⁾

Classe	Princeps	Molécule DCI	Niveau de preuve*	Modalités d'administration			Références
				Perf. S/C Continue Diluer avec NaCl 0,9%	Perf. S/C discontinue Ou injection directe Diluer avec NaCl 0,9% Max 50 ml	Particularités	
Antalgiques	Morphine [®]	Chlorhydrate de morphine	A	X	X		Vidal
	Oxynorm [®]	Chlorhydrate d'oxycodone	A	X	X		Vidal
	Acupan [®]	Nefopam	C	X	X		Hors AMM
	Contramal [®]	Tramadol	C	X	X		Hors AMM
	Ketamine [®]	Ketamine	C	X	X	Risque d'irritation locale	Hors AMM
	Fentanyl [®]	Citrate de Fentanyl	C	X	X		Hors AMM
	Sufentanil [®]	Sufentanil	C	X	X		Hors AMM
Antibiotiques	Rocéphine [®]	Ceftriaxone	A	Non	X	Diluer avec 3,5ml de lidocaïne (direct) ou dans 50ml NaCl 0,9% sur 30mn	Vidal
	Amiklin [®]	Amikacine	A	Non	X sur 1 heure	Posologie IM = SC 500mg à diluer dans 200ml sérum phy ou G5%	Vidal
	Targocid [®]	Teicoplanine	B	Non	X		Hors AMM
Antidotes	Narcan [®]	Naloxone	A	X	X		Vidal
	Anexate [®]	Flumazenil	B	X	X		Hors AMM
Anti-émétiques	Primpéram [®]	Métoclopramide	C	X	X		Hors AMM
	Zophren [®]	Ondansetron	C	X	X		Hors AMM
	Kytril [®]	Granisetron	C	X	X		Hors AMM
Anti-épileptiques	Gardenal [®]	Phenobarbital	C	X	X	Risque de douleur locale et nécrose	Hors AMM
	Rivotril [®]	Clonazepam	AP	X	X	Durée de vie du principe actif = 6h Eviter tubulure en PVC ou passer sur 4h	Hors AMM
Anti-histaminiques	Polaramine [®]	Dexchlorphéniramine	A	Non	X		Vidal

Anti-inflammatoires	Profenid®	<i>Kétoprofène</i>	AP	Non	X	Risque de douleur au point d'injection	Hors AMM
Anti-secrétoires	Atropine®	<i>Sulfate d'atropine</i>	A	Non	X	Réchauffer l'ampoule à température ambiante et injecter lentement (20 secondes)	Vidal
	Sandostatine®	<i>octreotide</i>	A	X	X		Vidal
	Scoburen®	<i>Scopolamine butylbromure</i>	A	X	X		Vidal
	Scopolamine®	<i>Bromhydrate de scopolamine</i>	A	X	X	Vidal	
	Somatuline®	<i>Lanréotide</i>	A	Non	X	Ne pas utiliser la forme en poudre à 30mg en S/C	Vidal
Anti-ulcéreux	Azantac®	Ranitidine	AP	X	X	Diluer dans 100ml et perfuser en moins de 6h à l'abri de la lumière	Hors AMM
	Mopral®	Omeprazole	B	Non			Hors AMM
	Raniplex®	Ranitidine	AP	X	X		Hors AMM
Benzodiazépine	Hypnovel®	Midazolam	B	X	X	Réactions cutanées Douleur locale si perfusion continue	Hors AMM
	Valium®	Diazepam	AP	Non recommandé	X		Hors AMM
Broncho-dilatateurs	Bricanyl®	Terbutaline	A	Non	X		Vidal
Corticoïdes	Solumedrol®	Méthylprednisolone	AP	Non	Injection directe ou dans une perfusette de 50ml sur 15mn 20 à 80mg/j		Hors AMM
Diurétiques	Lasilix®	Furosémide	B	X	X	Limiter à 20ml/site Douleur locale	Hors AMM
Laxatifs	Prostigmine®	Prostigmine	A	Non	X		Vidal
	Relistor®	Méthylnatrexone	A	Non	X		Vidal
Neuroleptiques	Haldol®	Halopéridol	C	X	X	Concentration max. : 1mg/ml G5% (risque de précipitation avec NaCl 0,9%)	Hors AMM
	Largactil®	Chlorpromazine	C	Non	X	Risque d'irritation locale	Hors AMM
	Loxapac®	Loxapine	C	Non	X	Max. 1 ampoule / injection	Hors AMM

* A : applicabilité scientifique établie / B : présomption scientifique d'applicabilité / C : faible niveau de preuve d'applicabilité / AP : utilisation sur la base d'un accord professionnel